

# *Anolis aliniger* Mertens 1939

## **Verbreitung:**

Dominikanische Republik, Hispaniola.

## **Biotop:**

*A. aliniger* gehört möglich zu einem neuen Oekomorph - dem Bromelientrichter Oekomorph. Er kommt im gebirgigen Regenwald in Höhen von 1000 bis 1400 Meter vor.

## **Beschreibung und Verhalten:**

*Anolis aliniger* ist ein kleiner *Anolis* mit einer KRL von 6 cm bei einer GL von 13 cm. Es handelt sich um eine bedächtige, wenig scheue, insektenfressende, hauptsächlich im Bromelientrichter lebende Echse. Empfehlenswert ist eine paarweise Haltung. Die Männchen sind meistens grün mit einem schwarzen Fleck hinter den Vorderbeinen. Die Weibchen sind überwiegend braun mit weisslichem Lateralstreifen. Die Tiere brauchen eine nächtliche Abkühlung. Im Winter darf die Nachttemperatur bis auf 12-15 °C sinken. Bei diesen niedrigen Temperaturen sind alle Tiere braun gefärbt.

## **Terrarium und Einrichtung:**

Die Abmessungen des Terrariums sollten mindestens 40x40x60 cm (LxBxH) betragen. Diese Anolisart benötigt viel Licht, z.B. 2 TL's oder PL's, 1 Reptisun Neonröhre (UV) und ein Spot im oberen Bereich - etwa dicht über einem Ast, wo die Tiere sich aufwärmen können. Mindestens zwei mittelgrosse, zartblättrige Bromelien auf verschiedenen Höhen als Rast,- und Versteckplätze und einige Kletteräste sollten in jeden Terrarium vorhanden sein. Eine Rückwand aus Kork ist ideal. Für den Boden kann ungedüngte Blumenerde, Torf oder Rindenmulch verwendet werden.

## **Futter:**

Kleine Insekten. Wiesenplankton ist ideal, zudem kann man Mehlkäferlarven, Wachsmottenraupen, Buffalowürmer, kleine Grillen, Fliegen und Obstfliegen geben. Alle Futtertiere sollte man mit einem Kalzium-Mineralpräparat wie z. B. Korvimin ZVT (angereichert mit 12% Kalziumcarbonat) bestäuben. Jeden Morgen ist mit handwarmem Wasser zu sprühen. Zweimal in der Woche 10 Tropfen Vitamin D3 aquosum und 1 Schachtel von 500 mg Kalzium Sandoz forte van Novartis (Apotheke) auf einen Liter Sprühwasser beimischen.

## **Fortpflanzung:**

Im Frühjahr und Sommer wird alle 12-14 Tage ein Ei abgesetzt. Die Eier werden wahlweise im Bodenmaterial oder im Trichter einer Bromelie abgelegt. Die Jungtiere schlüpfen bei einer Zeitigungstemperatur von 23-28 °C nach ungefähr 12 Wochen. Im Winter sollten die Tiere eine

Ruhepause einlegen, in der deutlich weniger Nahrung aufgenommen wird.

Literatur: Anolis von Axel Fläschendräger und Leo Wijffels. (Deutsch) ISBN N 3-931587-04-5  
Informationen im Internet unter <http://come.to/anoliscontactgroup>

Anolis Contact Group Caresheet. Autor: Piet van Beest